

# 肠道微生物群落研究进展及合成微生物群落面临的挑战

胡政<sup>1\*</sup>, 周茜<sup>1</sup>, 张蒙蒙<sup>1, 2</sup>, 肖敏凤<sup>3,4\*</sup>

<sup>1</sup> (中科院深圳先进技术研究院, 合成生物学研究所, 深圳 518055)

<sup>2</sup> (中国科学院大学, 北京 100049)

<sup>3</sup> (深圳华大生命科学研究院, 深圳 518083)

<sup>4</sup> (深圳市未知病原体应急检测重点实验室, 深圳 518083)

**摘要:** 近年来, 关于肠道微生物群落与人类健康的研究快速发展, 然而肠道微生物群落的调控和应用仍处于起步阶段。究其原因, 在于对人类肠道微生物群落结构和功能的理解不够深入。合成微生物群落通过人工合成的多个物种建立新的微生物群落体系, 利用各种体内外实验模型及数学建模方法进行模拟、测试、优化, 有助于深化对人类肠道复杂微生物群落的结构、稳定性和功能活性的了解。本文概述了肠道微生物群落研究的方法、影响微生物群落稳定性因素及合成肠道微生物群落面临的挑战, 以期为肠道微生物群落理论研究和临床应用的双向转化提供参考。

**关键词** 肠道微生物; 合成生物学; 宏基因组; 微生物相互作用

中图分类号: S718.52+1.3 文献标志码: A

doi: 10.12146/j.issn.2095-3135.20210427008

# Advances in Intestinal Microbial Communities and Challenges in Synthetic Microbial Communities

HU Zheng<sup>1</sup>, ZHOU Qian<sup>1</sup>, ZHANG Mengmeng<sup>1,2</sup>, XIAO Minfeng<sup>3,4</sup>

<sup>1</sup> (CAS Key Laboratory of Quantitative Engineering Biology, Shenzhen Institute of Synthetic Biology, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen 518055, China)

<sup>2</sup> (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

<sup>3</sup> (BGI-Shenzhen, Shenzhen 518083, China)

<sup>4</sup> (Shenzhen Key Laboratory of Unknown Pathogen Identification, Shenzhen 518083, China)

Corresponding Author: HU Zheng. CAS Key Laboratory of Quantitative Engineering Biology, Shenzhen Institute of Synthetic Biology, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, 518055, China. Email: [zheng.hu@siat.ac.cn](mailto:zheng.hu@siat.ac.cn).

来稿日期: 2021-04-27 修回日期: 2021-05-14

基金项目: 国家重点研发计划(2018YFA0902701); 中国科学院战略重点研究计划(XDB29050501, XDPB18); 国家自然科学基金(32025022, 3201101136); 深圳市科技创新委员会项目(KQTD2015033117210153, JCYJ20170818164139781)

作者简介: 胡政(通讯作者), 博士研究生导师, 研究方向为基因组学与进化遗传学, E-mail: [zheng.hu@siat.ac.cn](mailto:zheng.hu@siat.ac.cn); 周茜(共同一作), 博士, 研究方向为合成生物学治疗实体瘤、微生物群落研究; 张蒙蒙, 博士生, 研究方向为微生物多种群相互作用机理及应用、合成生物学治疗实体瘤、微生物群落研究; 肖敏凤(共同通讯作者), 副研究员, 硕士生导师, 研究方向为微生物基因组学和合成生物学 Email: [xiaominfeng@genomics.cn](mailto:xiaominfeng@genomics.cn)

---

Xiao Minfeng, BGI-Shenzhen, and Shenzhen Key Laboratory of Unknown Pathogen Identification, Shenzhen, 518083, China. E-mail: xiaominfeng@genomics.cn.

**Abstract:** In recent years, research on the intestinal microbial communities and human health has developed rapidly. However, the regulation and application of the intestinal microbial community are still in their infancy. The reason for this is that our understanding of the structure and function of the human gut microbiome is inadequate. Synthetic microbiota is a new microbial community established by artificial synthesis of multiple species, which is simulated, tested, and optimized by various experimental models and mathematical modeling methods *in vitro* and *in vivo*. It is helpful to deepen the understanding of the structure, stability, and functional activity of the complex microbiota in the human gut. We summarized the research methods of the intestinal microbiome, the factors affecting the stability of the intestinal microbiome, and the challenges facing the synthesis of the intestinal microbiome, in order to provide a reference for the bidirectional transformation of the theoretical research and clinical application of intestinal microbial community.

**Key words:** intestinal microbial community; synthetic biology; metagenome; microbial interaction

Funding: This project is supported by National Key R&D Program of China (2018YFA0902701), Strategic Priority Research Program of Chinese Academy of Sciences (XDB29050501, XDPB18), National Natural Science Foundation of China (32025022, 3201101136), Shenzhen Science Technology and Innovation (KQTD2015033117210153, JCYJ20170818164139781).

## 1. 引言

人类肠道微生物群落由大量复杂的微生物组成，受到宿主的出生方式、生活方式和遗传等因素的影响<sup>[1-4]</sup>。肠道微生物群落在机体免疫<sup>[5]</sup>、肠道内分泌<sup>[6]</sup>、药物作用和代谢<sup>[7]</sup>、宿主疾病（如炎症性肠炎<sup>[8, 9]</sup>、肿瘤<sup>[10-13]</sup>、自闭症<sup>[14]</sup>、肥胖<sup>[1, 15, 16]</sup>和糖尿病<sup>[17-19]</sup>）等方面都具有重要的作用，是疾病治疗的理想靶点。然而，肠道菌群的种类及数量繁多且绝大多数肠道微生物都不能体外培养，因此肠道微生物组在治疗中的研究及应用仍不成熟。尽管粪菌移植（Fecal microbiota transplantation, FMT）已经成为了一种恢复正常肠道微生物群落结构的方法，但近年来的一些临床研究表明 FMT 存在细菌播散感染的风险<sup>[20, 21]</sup>。因此，需要采用更加可控的方式进行肠道微生物群落的调控。

目前已经通过基因组测序平台对肠道微生物群落进行了大量研究，但微生物表型及其在微生物群落中的作用尚不能完全通过测序数据进行准确预测。例如，最近一项研究表明，仅基于基因组学和生长需求的文献信息，75% 肠道细菌种类代谢模型未能预测同一细菌种类在不同培养基中的生长情况<sup>[22]</sup>。近年来，培养组学的迅速发展使得可培养肠道微生物种类大大增加，然而这也仅仅占肠道微生物种类中极小的一部分<sup>[23]</sup>。解决这一问题的关键是引入工程化思维，结合基因组序列分析和培养组学的实验方法，严格控制实验系统中的变量，厘清微生物在肠道中的功能及其相互作用关系，从而为肠道微生物群落研究及应用扫清障碍。

合成微生物群落是一类微生物组成已知且复杂性降低的系统，可以通过实验干预和数学建模，从而实现对复杂的人类肠道微生物组的系统级理解。宏基因组分析促进了对肠道菌群组成的“自上而下”的观察<sup>[24]</sup>，但“自下而上”的方法可以帮助理解这些复杂的微生物群落是如何形成、相互作用和影响宿主的健康的<sup>[25, 26]</sup>。采用合成生物学的方法能加深我们对肠道微生物群落功能的理解。本文综述了肠道微生物群落的研究方法、影响微生物群落稳定性的因素、合成肠道微生物群落领域面临的挑战，以更好地利用合成微生物群落促进人类健康。

## 2. 肠道微生物群落的研究方法

目前，合成微生物群落构建有两种方法：自上而下和自下而上（图 1）。自上而下的方法主要涉及宏基因组学研究，其重点在于了解肠道菌群组成，以及环境扰动下菌群组成变化；而自下而上方法的重点在于理解这些不同微生物群落如何形成、交流和影响其宿主健康。

## 2.1 自上而下：利用宏组学研究微生物群落组成及功能

传统微生物群落研究通常采用自上而下的研究方法，通过改变肠道或生物反应器的生理生化性质以获得具有特定功能的微生物群落。随着测序技术的飞速发展，测序费用降低而通量扩大，使得我们得以利用高通量测序的方法对肠道微生物群落进行研究。16S rRNA 扩增子测序是最经典的肠道菌群鉴定方法<sup>[27, 28]</sup>。目前已经有研究采用 16S rRNA 绝对定量测序对微生物群落进行定量研究<sup>[28, 29]</sup>。然而，这种方法仅限于“属”水平的分辨率，且不能揭示人类肠道微生物组的功能作用。目前最普遍的是采用宏基因组学方法对肠道环境中所有微生物的 DNA 进行测序。这种方式避免了传统培养方法的缺陷，大大提高了发现新微生物的能力，并能够对生境中微生物群落的组成、分布及其动态变化进行全面研究。大多数微生物数据都是通过粪便样本的宏基因组、宏转录组研究收集的，而针对合成微生物组的宏蛋白质组学的研究相对较少。在模拟人类合成肠道微生物群落时，宏蛋白质组学研究可以增加功能、分类和生物量维度。Liao 等人开发了一个 iMetaLab 平台用于分析宏蛋白质组学数据，并使用体外微生物培养进行宏蛋白数据分析<sup>[30]</sup>。宏基因组、宏转录组、宏蛋白质和宏代谢组学等研究的出现给肠道微生物群落研究带来了新的变革，基于整合宏组学数据分析和合成微生物组模型已经成为了新的趋势，使我们能更全面地了解肠道微生物群落组成及其功能，更容易地控制微生物组培养过程中的时空变量，更好地优化合成微生物群落以治疗特定疾病，加快合成微生物群落的应用进程。

## 2.2 自下而上：利用分离的微生物构建合成微生物群落

采用合成生物学的思维自下而上地分离粪便样本中的微生物以重建微生物群落是一种了解肠道微生物群落的有效方式。这种方式具备以下优势：（1）合成微生物群落中的细菌组成已知、可控且具有较好的重复性。（2）由于没有病毒和病原体，分离培养的微生物群落比粪便更稳定和安全。（3）可以根据菌株对环境的敏感性来选择菌株，这进一步增加了合成微生物群落的成功率。通过将关键物种组合成为稳定的微生物群落，并与患者的微生物群落进行比较，能有效帮助设计合成平衡的人体肠道微生物群落。Petrof 等人设计了一个由 33 种细菌组成的合成微生物群落，发现这种合成的微生物环境能够治疗耐抗生素的艰难梭菌结肠炎<sup>[31]</sup>，该研究探索了构建合成微生物群落治疗肠道疾病的可行性。




图 1 肠道微生物群落的研究方法

Fig.1 Methods for the study of intestinal microbial community

## 3. 自下而上合成微生物群落的方法

### 3.1 利用营养互补关系合成微生物群落

肠道微生物与其它生物及其环境进行复杂的相互作用，大多数微生物是营养缺陷型，其生长依赖外部营养物质，包括氨基酸和维生素的交换<sup>[32]</sup>。因此，构建营养互补的微生物群落从而模拟微生物的互利共生关系是构建合成微生物群落的一种有效方式。一个典型的例子是 Mee 等人构建的一个由氨基酸营养缺陷型的大肠杆菌菌株组成的交叉喂养群落<sup>[33]</sup>。他们从大肠杆菌 MG1655 菌株获得了 14 个衍生营养缺陷型菌株，每个菌株都敲除了一个必需氨基酸的基因并观察到菌株两两共培养表现出显著的协同作用。400 代后，通过共享精氨酸、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸而建立强相互作用从而获得最快生长的配对营养缺陷型菌株占据了群落中的主导地位。类似的，在酿酒酵母和大肠杆菌等微生物中也已经构建了利用氨基酸营养缺陷型菌株的营养互补关系合成微生物群落<sup>[34, 35]</sup>。

### 3.2 利用群体感应系统调控微生物群落

群体感应（quorum sensing, QS）是一种细菌通过分泌和感受自诱导剂响应环境变化的一种分子通讯的形式，利用信号分子增强微生物之间的群体感应行为优化微生物群落结构与组成有助于增强群落结构的稳定性。但目前对于群体感应如何影响微生物群落的组成和功能仍不十分明确。细菌之间可通过群体感应信号分子，比如革兰氏阴性菌用于种内交流的高丝氨酸内酯（Acyl-HSL）、革兰氏阳性菌用于种内交流的寡肽类分子（AI-P）以及不同种属微生物之间可被多种细胞识别的 AI-2 信号分子等进行交流<sup>[36]</sup>。在合成微生物群落中，可以通过改造群体感应系统来调控微生物群落组成。Stephens 等人设计了一种在两个大肠杆菌菌株中起作用的细菌群体感应系统，通过细胞间的信号传导来决定微生物群落内细菌亚群的生长速度。第一种菌株感应小分子信号 AI-2，产生自诱导因子 AI-1。第二种大肠杆菌菌株由前一种菌株产生的 AI-1 信号控制糖运输蛋白 HPr 的转录来调节菌株在共培养中的生长速度，从而通过 AI-1 和 AI-2 之间的制衡调节群落的构成<sup>[37]</sup>。Hong 等基于细菌生物膜的共生关系构建了两株交替形成不同菌膜的枯草芽孢杆菌<sup>[38]</sup>。在 *E. coli* 中构建的 *LasR* QS 回路不但可以特异性识别铜绿假单胞菌产生的信号分子，且能利用该信号分子调控自身基因的表达，通过表达和分泌抗菌肽 Microcin S 和核酸酶 DNaseI 降解成熟的生物膜基质并杀死包裹其中的细菌<sup>[39]</sup>。

### 3.3 利用噬菌体改造微生物群落

研究发现，人类肠道宏基因组测序所得读长中有大约 5%-6% 来自噬菌体<sup>[40]</sup>。肠道微生物、噬菌体以及与宿主之间具有动态相互作用<sup>[41]</sup>。Ma 等人利用人体肠道微生物大数据鉴定了大量的肠道噬菌体，这些噬菌体携带的功能基因与细菌在肠道中的生存适应性相关。与广谱性抗生素相比，噬菌体感染宿主细菌具有较高的专一性，因此利用噬菌体携带小分子药物或 CRISPR 元件可能是精准地消除微生物群落中的特定菌株或编辑微生物群落中的特定基因的有效方式<sup>[42, 43]</sup>。Song 等人开发了一种识别活性噬菌体的工具，有助于构建工程化噬菌体用于改造微生物群落<sup>[44]</sup>。Hsu 等人使用限菌小鼠模型研究了噬菌体对肠道细菌群落的动态影响，发现噬菌体捕食不仅直接影响对噬菌体敏感的细菌，还通过细菌间的相互作用对其他细菌产生级联效应。此外，代谢组学分析显示，噬菌体捕食引起的菌群变化对肠道代谢组产生了直接的影响<sup>[45]</sup>。这些工作表明，利用噬菌体特异性感染并杀死细菌的特性改造噬菌体以实现调节和改造肠道菌群不失为一种具有前景的微生物群落调控方法，在哺乳动物疾病治疗方面存在潜在应用的价值。

## 4. 影响肠道微生物群落稳定性的因素

### 4.1 微生物之间的相互作用影响群落稳定性

微生物群落的稳定性十分重要，复杂群落内微生物的相互作用一直是菌群研究的瓶颈之

一。微生物的种间互作关系可以是正向也可以是负向的，即协同或拮抗<sup>[46]</sup>。通常情况下，群落相比单一物种具有更好的稳定性和抗干扰能力。例如 Palleja 等人对健康成年人肠道微生物群落的研究发现，尽管抗生素处理初期出现了群落组成的改变，如肠杆菌和其他病原菌（如粪肠球菌和核梭杆菌）的大量繁殖，以及双歧杆菌和丁酸生产量的减少，但健康人的肠道菌群对短期广谱抗生素干预有一定抵抗性，一段时间后群落组成逐渐恢复到接近原来的水平<sup>[47]</sup>，然而肠道中微生物相互作用如何影响群落的稳定性尚不十分清楚。自然条件下的多细胞体系常常形成错综复杂的相互作用关系网络<sup>[32, 46]</sup>。传统观点认为，在稳态条件下，竞争单一限制性底物的物种不能共存，这样的竞争关系组成的微生物群落稳定性较低<sup>[48]</sup>。然而 Coyte 等人通过动力学分析表明，合作关系导致了物种与正反馈回路耦合，增加了微生物成员的依赖性，从而降低了群落的稳定性。而竞争则有助于提高微生物群落的稳定性，即高物种丰度的微生物群落主要通过竞争关系抑制合作引起的正反馈回路，从而提高群落的稳定性<sup>[49]</sup>。应充分考虑不同菌株间的竞争、合作关系，以构建具有较高稳定性的合成微生物群落。

#### 4.2 微生物群落对宿主肠道免疫耐受是其成功定殖的关键

据估计，人类微生物群落中含有多达  $10^{14}$  个细菌细胞，是体内存在的人类细胞数量的 10 倍，肠腔成为了人体和外来微生物直接接触的最大区域<sup>[50, 51]</sup>。由于营养物质必须经上皮细胞吸收，肠道表面必须保持一定的通透性，但同时，肠道作为免疫系统的一道重要防线，健康的肠道必须具备阻挡病原体的能力。因此，微生物群落需要在肠道内成功生存并定殖才能发挥作用。微生物在肠道内成功定殖主要是由以下两个方面的原因造成的：

肠道固有结构层面，宿主肠道物理结构（如肠绒毛）诱导肠道微生物区隔化。健康宿主肠道黏液屏障由高糖基化黏液蛋白 2（mucin 2， MUC2）包围形成。肠道黏膜的存在使得肠道免疫系统能够对大量不断变化的无害微生物建立免疫耐受，同时保持免疫反应，以抵御致病菌或共生菌入侵无菌身体环境<sup>[52, 53]</sup>。此外，MUC2 也通过抑制肠道树突状细胞向炎性状态转变从而限制了肠道抗原的免疫原性<sup>[54, 55]</sup>。黏膜单层上皮细胞将肠腔与下层组织物理分隔，限制了上皮细胞屏障通透性。因此，从物理结构上保障了微生物群落在肠道内的生存能力。

生物层面，肠道共生细菌的存在可以帮助抵御外来微生物的入侵。许多常见的肠道菌群物种如乳酸菌和双歧杆菌可通过产生抗菌肽避免肠道感染外源微生物<sup>[56]</sup>。共生细菌也通过支持上皮屏障，协助伤口愈合，招募中性粒细胞和白细胞等方式调控免疫系统。在一些研究中，共生细菌 DNA 通过调节不同类型 T 细胞的水平，帮助宿主对潜在的病原体做出反应，甚至阻止肿瘤的发生<sup>[57]</sup>。微生物代谢物，如芳烃受体 AHR 的配体吲哚-3-醛，能刺激 ILC3 从而诱导 IL-22 的产生。IL-22 上调 AMP 的表达，提高肠道对病原菌的定殖抗性<sup>[58]</sup>。研究表明，无菌小鼠肠道固有层中产生 IgA 的浆细胞和 CD4<sup>+</sup>T 细胞水平急剧下降，黏液层变薄且组成异常，防御素表达受损。与微生物群落完整的小鼠相比，无菌小鼠肠道相关淋巴组织（Peyer's patches，肠系膜淋巴结）更小，包含的免疫细胞数量和种类更少。因此，无菌小鼠更容易受到细菌感染，某些疾病的症状也可能更严重<sup>[56, 59, 60]</sup>。利用这一点，通常采用抗生素处理减少肠道细菌，从而提高合成微生物群落在肠道内的定殖水平。

#### 4.3 微生物群落的空间分布影响其环境适应能力

肠道微生物表现出不同的粘附特性和生长速率，这可能导致肠道微生物群落成员的空间分布差异<sup>[61, 62]</sup>。基于微生物在黏液层或管腔中的定位而产生的差异复制可能进一步放大由于不同粘附情况而形成的差异<sup>[63, 64]</sup>。空间结构对建立和维持肠道微生物群落成员和宿主之间的关系的信号和代谢交换有强大的影响。然而，关于肠道微生物群落空间分布的信息有限。Welch 团队从人类粪便分离物中开发 15 种微生物组成合成生态系统用于研究肠道微生物群落空间分布。然而，微生物并未呈现出典型的位置特异性分布，只是在一些位置中的细菌组

---

成比例有所差异，如肠内壁被粘液包裹的上皮细胞和中央富含食物和粘液的肠腔中。这些位置的微生物种群与整体组成有所不同，即不同细菌的相对比例可能会发生波动，但整体上细菌分布并没有明显差异<sup>[65]</sup>。随着测序技术的发展，MaPS-seq 得以实现肠道细菌生物地理图谱的绘制，揭示群落功能的相互作用。小鼠肠道不同区域内，微生物分布不均，但在小尺度（7μm 左右）范围内部分细菌呈现一定的相关性<sup>[66]</sup>。高丰度拟杆菌门（Bacteroidales）类群的物种通常含有多种碳水化合物活性酶<sup>[67]</sup>，且能通过协同代谢互养共生，促进细菌空间共生<sup>[68]</sup>。而共生群落在应对不同环境时表现出种群空间协作行为，有利于提高其环境适应性<sup>[69]</sup>。Coyte 等人的模型表明，空间结构的引入在不减弱细菌相互作用的情况下提高了其群落稳定性，因此，肠道微生物可能会通过空间上的分区更好地发挥功能，适应环境<sup>[49]</sup>。

## 5. 优化合成肠道微生物群落面临的挑战

### 5.1 确定核心微生物及其代谢功能

目前，评价合成肠道生态系统有效性主要是关注以下几个指标：核心肠道微生物的相对丰度、反映微生物丰富度和均匀度的微生物多样性指数、短链脂肪酸等主要肠道代谢产物的含量和比例等<sup>[50]</sup>。然而，人类肠道菌群的微生物种类及数量极为丰富，导致难以确定核心肠道微生物及其代谢功能。由于代谢相互作用的强弱与空间相对位置有关，因此在物种选择上有必要考虑物种空间位置及其代谢功能进行综合判断。群落的复杂性也是需要考虑的一个重要因素。低复杂性的群落具有更高的可重复性和操作性，但是有可能缺少自然群落中的关键物种或功能物种。高复杂性的群落在维持群落的多样性上更具优势，但这也意味着可操作性的降低，需要对群落成分比例进行更精细的设定。此外，疾病类型、治疗方法、患者性别、年龄、饮食习惯等因素都会造成肠道菌群的改变<sup>[8, 13, 70-73]</sup>，因此需要整合这些因素进行微生物群落组成分析，以建立个性化的合成肠道生态系统。

### 5.2 选择合适的培养系统分离肠道微生物

选择适合微生物群落中各种细菌生长的培养基是十分必要的。迄今为止，大多数肠道微生物群落是在化学成分未知的复杂培养基中培养的，在特定或最小培养基中只有少数微生物得以生长，这不利于肠道微生物的分离和培养。厌氧培养对几种肠道细菌的营养和生理要求非常苛刻。由于厌氧培养常用的培养基如 GAM 厌氧培养基、BHI 培养基、强化梭菌培养基、胰蛋白酶大豆培养基等具有特殊性，培养基的选择极大地限制了微生物群落的构建<sup>[74]</sup>。近年来，培养组学方法使得多种以前不能培养的微生物得以成功培养和鉴定，在此过程中培养系统的改进起着至关重要的作用<sup>[23, 74-77]</sup>。Ines Thiele 研究组结合了大数据和人工智能的方式构建了一个包含 773 个不同肠道微生物的计算机模型 AGORA（Assembly of gut organisms through reconstruction and analysis）以模拟微生物代谢过程，分析各菌株对其他微生物及宿主代谢的影响，针对拟培养的特定的肠道微生物群落优化培养基组成<sup>[78]</sup>。另外，Yang 等人采用基于质谱的靶向代谢组学方法研究了无机盐、胆盐、短链脂肪酸和粘蛋白等四种培养基成分对体外培养的肠道微生物群落的调控作用，其结果表明在体外培养过程中应补充相应成分以模拟肠道环境<sup>[79]</sup>。

### 5.3 选择合适的研究模型

确定合成微生物群落的培养条件后，需要采用模拟肠道环境的不同体外模型对合成微生物群落的功能进行测试与评估。利用简单的肠道生物反应器系统（如微量孔板系统）能有效地研究益生菌和药物与肠道微生物群落的简单相互作用<sup>[80]</sup>。连续生物反应器系统（如多级结肠模型）能调控物质的流入和流出，能帮助理解营养物质、pH 值及其他条件对肠道微生物群落的长期影响，有助于设计合成肠道微生物群落<sup>[81, 82]</sup>。

---

早期研究中所用到的生物反应器与实际肠道环境有较大差异，因此近年来一些研究采用了生物反应器与模拟消化系统相结合以更好地模拟肠道生理生化环境，包括消化酶和胆盐的添加、pH值和停留时间的改变以及模拟人类肠道的蠕动运动等。然而，这类生物反应器系统均未考虑宿主上皮系统的影响。近年来 HuMiX 平台和肠芯片等体外肠道模型增加了宿主黏液层和人类细胞系以更好地模拟宿主-微生物相互作用，因而得到了肠道微生物群落研究者的青睐<sup>[83-86]</sup>。然而，现有的肠道模型仍需要进一步发展。

尽管这些反映宿主效应的体外模型可以在一定程度上研究多种代谢活性肠道微生物群落的作用，但最终其代谢产物和微生物群落的组成可能与人类肠道微生物不同。因此，有必要在动物模型（如秀丽隐杆线虫和小鼠）中评价合成微生物群落的有效性。一些体内肠道微生物群落研究只使用了小鼠，但某些不可忽视的宿主特异性差异仍然存在于小鼠和人之间，包括免疫差异、转运时间及肠道结构等因素。现有的活体研究在直接预测合成微生物群落的作用方面也有局限性。因此，肠道微生物与其他肠道微生物群及宿主的相互关系需要通过合成肠道生态系统和活体动物模型相结合开展研究。

#### 5. 4 选择合适的数学模型

数学建模在理解肠道微生物群落动态和行为方面具有重要价值。通过宏组学可以获得肠道微生物群落的动态变化，结合数学模型又为了解群落动力学的机制和基本原理提供新的见解。由于肠道微生物群落组成极其复杂，因此，需要对群落结构进行简化，以进行数学模型开发和校正，校正后的模型可以进一步通过实验进行测试。不断改进的数学模型和实验验证可以更好地理解人类肠道微生物群落中的相互作用。

肠道微生物群落中常采用基于微分方程的动力学模型进行群落动态研究，如广义的 Lotka-Volterra 模型（GLV）。GLV 模型利用个体种群的内在增长率和微生物种群间相互作用调节的增长率来解释群落动态，由于模型假设的参数比其他模型要少，因此该模型便于结合实验进行验证<sup>[87, 88]</sup>。先前的研究表明，肠道细菌可能有助于控制调节性 T 细胞（Regulatory T cells, Treg）的数量。特定的细菌组合可以刺激这些 Treg 细胞，并可能抑制炎症。通过调节肠道中不同种类的微生物可能为治疗溃疡性结肠炎等疾病提供一种新方法。然而，逐一测试肠道微生物群落的组成将是极具挑战性的。因此，Stein 等人利用扩展的 GLV 模型探究感染和炎症性疾病（包括艰难梭菌定植和炎症性肠病）的背景下微生物组的时序动力学并预测其稳定性<sup>[88]</sup>。

随着高通量测序、多组学联合分析的发展，各种数学建模和实验的综合方法已被应用于不同分辨率、时间和空间尺度的肠道微生物群落，包括基因、个体和种群。构建基因组尺度代谢模型（Genome-scale metabolic models, GEMs）描述微生物群落的代谢途径能更好地利用组学数据进行综合分析。GEMs 建模方法通常是基于高通量组学数据和已知的生化反应数据库从而构建代谢网络。其中，代谢流平衡分析（Flux balance analysis, FBA）是用数学方法对代谢网络里的代谢流进行拟合分析，是目前微生物群落代谢网络重构及代谢模拟最常用的方法之一。FBA 分析主要用于描述稳态下（即群落代谢物的产生与消耗平衡）的系统特性，采用胞内代谢物达到平衡后的数据计算不同支路代谢流的分布情况，定量预测细胞内的反应通量、代谢物的消耗及产生速率以及细胞生长速率，从而获得特定条件下细胞代谢的全景。Cole 等人通过空间扩散模型耦合多个动态 FBA 模型的方式提出空间动态通量平衡分析（3-Dimensional dynamic flux-balance analysis, 3DdFBA），模拟细菌与其他细菌的代谢产物交换，预测了大肠杆菌菌落的生长特征，并识别出醋酸盐和乳酸盐的交叉喂养情况<sup>[89]</sup>。Chan 等人在 FBA 模型的基础上给群落所有成员施加了恒定的平均增长率以确保群落的共存和稳定。在没有这种限制的情况下，生长速度更快的微生物最终将取代群落中所有其他微生物<sup>[90]</sup>。

近年来，机器学习和深度学习算法在肠道菌群数据挖掘方面取得了很大的进展，基于组

学数据的建模可以预测多菌株群落的交叉喂养和竞争机制，根据微生物代谢产物（如丁酸盐和功能性胞外多糖等）设计最佳微生物群落<sup>[78, 91]</sup>。有研究团队利用机器学习从多组学数据中识别噬菌体并挖掘噬菌体与细菌宿主的关系，为利用噬菌体改造微生物群落奠定了基础<sup>[44, 92-95]</sup>。然而，尽管具有很好的应用前景，不可否认的是目前利用机器学习算法进行肠道菌群数据分析仍存在以下不足：1、缺乏对机器学习算法的设计及特异性优化；2、机器学习通常需要大量的训练数据，训练数据集的规模不够大则容易导致构建的模型不具有普适性；3、肠道菌群的数据影响因素较多，导致数据可能不具有足够的特征性，难以获得性能良好的训练模型<sup>[96]</sup>。机器学习和深度学习算法作为肠道微生物群落数据分析及合成微生物群落构建的工具仍需要进一步优化。

综上，选择合适的数学模型可以帮助我们更好地分析肠道微生物群落数据、理解微生物群落中的相互作用并优化肠道微生物群落的组成。




图 2 合成肠道微生物群落面临的挑战

Fig.2 Challenges in synthesizing the gut microbiome

## 6. 总结与展望

自上而下的宏组学研究方法及自下而上的合成生物学技术手段在肠道微生物群落研究中均发挥着独特的作用，具有较大的应用潜力，但仍有大量问题亟待解决。例如，需要优化宏组学大数据分析方法，获得更准确的微生物代谢及相互作用等信息；需要确定在不同类型肠道疾病治疗中，什么情况下合成微生物群落相比较单菌更具有优势；微生物群落的物种数量是否存在最优解；如何优化细胞通信基因回路、改进微生物与宿主代谢互作网络提高合成微生物群落各组分在肠道中承担复杂任务、发挥特定功能的能力<sup>[97]</sup>；如何通过揭示控制肠道微生物自身及其与宿主的相互作用规律帮助我们理性设计肠道微生物群落以帮助改善人体健康；随着测序技术的进一步发展，如何整合繁杂的宏组学数据进一步优化微生物群落用于疾病监测与治疗。未来应深化宏组学、合成生物学与其他学科的交叉，充分利用宏组学的大数据特征及合成生物学的定量、工程化等优势，进一步开展对天然微生物群落相互作用机制的研究，最终设计一套普适性强、稳定性高、精确可控的合成微生物群落构建方法，以应用于人类健康事业。

---

## 参考文献

- [1] Igarashi M, Morimoto M, Suto A, et al. Synthetic dietary inulin, Fuji FF, delays development of diet-induced obesity by improving gut microbiota profiles and increasing short-chain fatty acid production [J]. *PeerJ*, 2020, 8: e8893.
- [2] Korpela K, Helve O, Kolho KL, et al. Maternal Fecal Microbiota Transplantation in Cesarean-Born Infants Rapidly Restores Normal Gut Microbial Development: A Proof-of-Concept Study [J]. *Cell*, 2020, 183(2): 324-334 e325.
- [3] Liu Y, Qin S, Song Y, et al. The Perturbation of Infant Gut Microbiota Caused by Cesarean Delivery Is Partially Restored by Exclusive Breastfeeding [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2019, 10: 598.
- [4] Torres J, Hu J, Seki A, et al. Infants born to mothers with IBD present with altered gut microbiome that transfers abnormalities of the adaptive immune system to germ-free mice [J]. *Gut*, 2020, 69(1): 42-51.
- [5] Viaud S, Daillere R, Boneca IG, et al. Harnessing the intestinal microbiome for optimal therapeutic immunomodulation [J]. *Cancer Research*, 2014, 74(16): 4217-4221.
- [6] Chen J, Li Y, Tian Y, et al. Interaction between Microbes and Host Intestinal Health: Modulation by Dietary Nutrients and Gut-Brain-Endocrine-Immune Axis [J]. *Current Protein and Peptide Science*, 2015, 16(7): 592-603.
- [7] Alexander JL, Wilson ID, Teare J, et al. Gut microbiota modulation of chemotherapy efficacy and toxicity [J]. *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology*, 2017, 14(6): 356-365.
- [8] Sheehan D, Moran C and Shanahan F. The microbiota in inflammatory bowel disease [J]. *Journal of Gastroenterology*, 2015, 50(5): 495-507.
- [9] Norman JM, Handley SA, Baldridge MT, et al. Disease-specific alterations in the enteric virome in inflammatory bowel disease [J]. *Cell*, 2015, 160(3): 447-460.
- [10] Nagano T, Otoshi T, Hazama D, et al. Novel cancer therapy targeting microbiome [J]. *OncoTargets and Therapy*, 2019, 12: 3619-3624.
- [11] Bhatt AP, Redinbo MR and Bultman SJ. The role of the microbiome in cancer development and therapy [J]. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 2017, 67(4): 326-344.
- [12] Laborda-Illanes A, Sanchez-Alcoholado L, Dominguez-Recio ME, et al. Breast and Gut Microbiota Action Mechanisms in Breast Cancer Pathogenesis and Treatment [J]. *Cancers (Basel)*, 2020, 12(9).
- [13] Sanchez-Alcoholado L, Ramos-Molina B, Otero A, et al. The Role of the Gut Microbiome in Colorectal Cancer Development and Therapy Response [J]. *Cancers (Basel)*, 2020, 12(6).
- [14] Zhang M, Chu Y, Meng Q, et al. A quasi-paired cohort strategy reveals the impaired detoxifying function of microbes in the gut of autistic children [J]. *Science Advances*, 2020, 6(43).
- [15] Ridaura VK, Faith JJ, Rey FE, et al. Gut microbiota from twins discordant for obesity modulate metabolism in mice [J]. *Science*, 2013, 341(6150): 1241214.
- [16] Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, et al. A core gut microbiome in obese and lean twins [J]. *Nature*, 2009, 457(7228): 480-484.
- [17] Tilg H and Moschen AR. Microbiota and diabetes: an evolving relationship [J]. *Gut*, 2014, 63(9): 1513-1521.

- 
- [18] Karlsson FH, Tremaroli V, Nookaew I, et al. Gut metagenome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control [J]. *Nature*, 2013, 498(7452): 99-103.
  - [19] Zhao L, Zhang F, Ding X, et al. Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes [J]. *Science*, 2018, 359(6380): 1151-1156.
  - [20] DeFilipp Z, Bloom PP, Torres Soto M, et al. Drug-Resistant *E. coli* Bacteremia Transmitted by Fecal Microbiota Transplant [J]. *New England Journal of Medicine*, 2019, 381(21): 2043-2050.
  - [21] Blaser MJ. Fecal Microbiota Transplantation for Dysbiosis - Predictable Risks [J]. *New England Journal of Medicine*, 2019, 381(21): 2064-2066.
  - [22] Tramontano M, Andrejev S, Pruteanu M, et al. Nutritional preferences of human gut bacteria reveal their metabolic idiosyncrasies [J]. *Nature Microbiology*, 2018, 3(4): 514-522.
  - [23] Lagier JC, Dubourg G, Million M, et al. Culturing the human microbiota and culturomics [J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2018, 16: 540-550.
  - [24] Human Microbiome Project C. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome [J]. *Nature*, 2012, 486(7402): 207-214.
  - [25] Grosskopf T and Soyer OS. Synthetic microbial communities [J]. *Current Opinion in Microbiology*, 2014, 18: 72-77.
  - [26] Chen M, Tan Y, Dai L, et al. Design and application of synthetic microbial communities [J]. *Chinese Science Bulletin*, 2020, 66(3): 273-283.
  - [27] Walker AW, Martin JC, Scott P, et al. 16S rRNA gene-based profiling of the human infant gut microbiota is strongly influenced by sample processing and PCR primer choice [J]. *Microbiome*, 2015, 3: 26.
  - [28] Stammler F, Glasner J, Hiergeist A, et al. Adjusting microbiome profiles for differences in microbial load by spike-in bacteria [J]. *Microbiome*, 2016, 4(1): 28.
  - [29] Vandeputte D, Kathagen G, D'Hoe K, et al. Quantitative microbiome profiling links gut community variation to microbial load [J]. *Nature*, 2017, 551(7681): 507-511.
  - [30] Liao B, Ning Z, Cheng K, et al. iMetaLab 1.0: a web platform for metaproteomics data analysis [J]. *Bioinformatics*, 2018, 34(22): 3954-3956.
  - [31] Petrof EO, Gloor GB, Vanner SJ, et al. Stool substitute transplant therapy for the eradication of *Clostridium difficile* infection: 'RePOOPulating' the gut [J]. *Microbiome*, 2013, 1(1): 3.
  - [32] Zengler K and Zaramela LS. The social network of microorganisms - how auxotrophies shape complex communities [J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2018, 16(6): 383-390.
  - [33] Mee MT, Collins JJ, Church GM, et al. Syntrophic exchange in synthetic microbial communities [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2014, 111(20): E2149-2156.
  - [34] Kerner A, Park J, Williams A, et al. A programmable *Escherichia coli* consortium via tunable symbiosis [J]. *PLoS ONE*, 2012, 7(3): e34032.
  - [35] Shou W, Ram S and Vilar JM. Synthetic cooperation in engineered yeast populations [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2007, 104(6): 1877-1882.
  - [36] Stephens K and Bentley WE. Synthetic Biology for Manipulating Quorum Sensing in Microbial Consortia [J]. *Trends in Microbiology*, 2020, 28(8): 633-643.

- 
- [37] Stephens K, Pozo M, Tsao CY, et al. Bacterial co-culture with cell signaling translator and growth controller modules for autonomously regulated culture composition [J]. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 4129.
  - [38] Hong SH, Hegde M, Kim J, et al. Synthetic quorum-sensing circuit to control consortial biofilm formation and dispersal in a microfluidic device [J]. *Nature Communications*, 2012, 3: 613.
  - [39] Hwang IY, Tan MH, Koh E, et al. Reprogramming microbes to be pathogen-seeking killers [J]. *ACS Synth Biol*, 2014, 3(4): 228-237.
  - [40] Arumugam M, Raes J, Pelletier E, et al. Enterotypes of the human gut microbiome [J]. *Nature*, 2011, 473(7346): 174-180.
  - [41] Federici S, Nobs SP and Elinav E. Phages and their potential to modulate the microbiome and immunity [J]. *Cellular and Molecular Immunology*, 2021, 18(4): 889-904.
  - [42] Ma Y, You X, Mai G, et al. A human gut phage catalog correlates the gut phageome with type 2 diabetes [J]. *Microbiome*, 2018, 6(1): 24.
  - [43] Zheng DW, Dong X, Pan P, et al. Phage-guided modulation of the gut microbiota of mouse models of colorectal cancer augments their responses to chemotherapy [J]. *Nature Biomedical Engineering*, 2019, 3(9): 717-728.
  - [44] Song W, Sun HX, Zhang C, et al. Prophage Hunter: an integrative hunting tool for active prophages [J]. *Nucleic Acids Research*, 2019, 47(W1): W74-W80.
  - [45] Hsu BB, Gibson TE, Yeliseyev V, et al. Dynamic Modulation of the Gut Microbiota and Metabolome by Bacteriophages in a Mouse Model [J]. *Cell Host & Microbe*, 2019, 25(6): 803-814 e805.
  - [46] Faust K and Raes J. Microbial interactions: from networks to models [J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2012, 10(8): 538-550.
  - [47] Allesina S and Tang S. Stability criteria for complex ecosystems [J]. *Nature*, 2012, 483(7388): 205-208.
  - [48] Grover JP. Predation, competition, and nutrient recycling: a stoichiometric approach with multiple nutrients [J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2004, 229(1): 31-43.
  - [49] Coyte KZ, Schluter J and Foster KR. The ecology of the microbiome: Networks, competition, and stability [J]. *Science*, 2015, 350(6261): 663-666.
  - [50] Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, et al. Gut microbiota in health and disease [J]. *Physiological Reviews*, 2010, 90(3): 859-904.
  - [51] Sender R, Fuchs S and Milo R. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body [J]. *PLoS Biology*, 2016, 14(8): e1002533.
  - [52] Mowat AM. To respond or not to respond - a personal perspective of intestinal tolerance [J]. *Nature Reviews Immunology*, 2018, 18(6): 405-415.
  - [53] Arike L and Hansson GC. The Densely O-Glycosylated MUC2 Mucin Protects the Intestine and Provides Food for the Commensal Bacteria [J]. *Journal of Molecular Biology*, 2016, 428(16): 3221-3229.
  - [54] Melo-Gonzalez F, Fenton TM, Forss C, et al. Intestinal mucin activates human dendritic cells and IL-8 production in a glycan-specific manner [J]. *Journal of Biological Chemistry*, 2018, 293(22): 8543-8553.
  - [55] Shan M, Gentile M, Yeiser JR, et al. Mucus enhances gut homeostasis and oral tolerance by delivering immunoregulatory signals [J]. *Science*, 2013, 342(6157): 447-453.

- 
- [56] Belkaid Y and Hand TW. Role of the microbiota in immunity and inflammation [J]. *Cell*, 2014, 157(1): 121-141.
  - [57] Erdman SE and Poutahidis T. Gut microbiota modulate host immune cells in cancer development and growth [J]. *Free Radical Biology & Medicine*, 2017, 105: 28-34.
  - [58] Zelante T, Iannitti RG, Cunha C, et al. Tryptophan catabolites from microbiota engage aryl hydrocarbon receptor and balance mucosal reactivity via interleukin-22 [J]. *Immunity*, 2013, 39(2): 372-385.
  - [59] Sommer F and Backhed F. The gut microbiota--masters of host development and physiology [J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2013, 11(4): 227-238.
  - [60] Macpherson AJ and Uhr T. Induction of protective IgA by intestinal dendritic cells carrying commensal bacteria [J]. *Science*, 2004, 303(5664): 1662-1665.
  - [61] Gunning AP, Kirby AR, Fuell C, et al. Mining the "glycocode"--exploring the spatial distribution of glycans in gastrointestinal mucin using force spectroscopy [J]. *FASEB Journal*, 2013, 27(6): 2342-2354.
  - [62] McLoughlin K, Schluter J, Rakoff-Nahoum S, et al. Host Selection of Microbiota via Differential Adhesion [J]. *Cell Host & Microbe*, 2016, 19(4): 550-559.
  - [63] Li H, Limenitakis JP, Fuhrer T, et al. The outer mucus layer hosts a distinct intestinal microbial niche [J]. *Nature Communications*, 2015, 6: 8292.
  - [64] Wadolkowski EA, Laux DC and Cohen PS. Colonization of the streptomycin-treated mouse large intestine by a human fecal *Escherichia coli* strain: role of growth in mucus [J]. *Infection and Immunity*, 1988, 56(5): 1030-1035.
  - [65] Mark Welch JL, Hasegawa Y, McNulty NP, et al. Spatial organization of a model 15-member human gut microbiota established in gnotobiotic mice [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2017, 114(43): E9105-E9114.
  - [66] Sheth RU, Li M, Jiang W, et al. Spatial metagenomic characterization of microbial biogeography in the gut [J]. *Nature Biotechnology*, 2019, 37(8): 877-883.
  - [67] Ormerod KL, Wood DL, Lachner N, et al. Genomic characterization of the uncultured Bacteroidales family S24-7 inhabiting the guts of homeothermic animals [J]. *Microbiome*, 2016, 4(1): 36.
  - [68] Rakoff-Nahoum S, Foster KR and Comstock LE. The evolution of cooperation within the gut microbiota [J]. *Nature*, 2016, 533(7602): 255-259.
  - [69] Li L, Wu T, Wang Y, et al. Spatial coordination in a mutually beneficial bacterial community enhances its antibiotic resistance [J]. *Communications Biology*, 2019, 2: 301.
  - [70] Scher JU, Sczesnak A, Longman RS, et al. Expansion of intestinal *Prevotella copri* correlates with enhanced susceptibility to arthritis [J]. *Elife*, 2013, 2: e01202.
  - [71] Badal VD, Vaccariello ED, Murray ER, et al. The Gut Microbiome, Aging, and Longevity: A Systematic Review [J]. *Nutrients*, 2020, 12(12).
  - [72] Galvez-Ontiveros Y, Paez S, Monteagudo C, et al. Endocrine Disruptors in Food: Impact on Gut Microbiota and Metabolic Diseases [J]. *Nutrients*, 2020, 12(4).
  - [73] Cutolo M and Straub RH. Sex steroids and autoimmune rheumatic diseases: state of the art [J]. *Nature Reviews. Rheumatology*, 2020, 16(11): 628-644.
  - [74] Rettedal EA, Gumpert H and Sommer MO. Cultivation-based multiplex phenotyping of human gut microbiota allows targeted recovery of previously uncultured bacteria [J].

- 
- Nature Communications, 2014, 5: 4714.
- [75] Chen YR, Zhou LZ, Fang ST, et al. Isolation of Desulfovibrio spp. from human gut microbiota using a next-generation sequencing directed culture method [J]. Letters in Applied Microbiology, 2019, 68(6): 553-561.
- [76] Lagier JC, Khelaifia S, Alou MT, et al. Culture of previously uncultured members of the human gut microbiota by culturomics [J]. Nature Microbiology, 2016, 1: 16203.
- [77] Allen-Vercoe E. Bringing the gut microbiota into focus through microbial culture: recent progress and future perspective [J]. Current Opinion in Microbiology, 2013, 16(5): 625-629.
- [78] Magnusdottir S, Heinken A, Kutt L, et al. Generation of genome-scale metabolic reconstructions for 773 members of the human gut microbiota [J]. Nature Biotechnology, 2017, 35(1): 81-89.
- [79] Yang K, Xu M and Zhu J. Evaluating the Impact of Four Major Nutrients on Gut Microbial Metabolism by a Targeted Metabolomics Approach [J]. Journal of Proteome Research, 2020, 19(5): 1991-1998.
- [80] Likotrafiti E, Tuohy KM, Gibson GR, et al. An in vitro study of the effect of probiotics, prebiotics and synbiotics on the elderly faecal microbiota [J]. Anaerobe, 2014, 27: 50-55.
- [81] Paul W, Marta C and Tom VW. Resolving host-microbe interactions in the gut: the promise of in vitro models to complement in vivo research [J]. Current Opinion in Microbiology, 2018, 44: 28-33.
- [82] Feria-Gervasio D, Tottey W, Gaci N, et al. Three-stage continuous culture system with a self-generated anaerobiosis to study the regionalized metabolism of the human gut microbiota [J]. Journal of Microbiological Methods, 2014, 96: 111-118.
- [83] Venema K and van den Abbeele P. Experimental models of the gut microbiome [J]. Best Practice and Research. Clinical Gastroenterology, 2013, 27(1): 115-126.
- [84] Huh D, Matthews BD, Mammoto A, et al. Reconstituting organ-level lung functions on a chip [J]. Science, 2010, 328(5986): 1662-1668.
- [85] Jang KJ and Suh KY. A multi-layer microfluidic device for efficient culture and analysis of renal tubular cells [J]. Lab on a Chip, 2010, 10(1): 36-42.
- [86] Lee PJ, Hung PJ and Lee LP. An artificial liver sinusoid with a microfluidic endothelial-like barrier for primary hepatocyte culture [J]. Biotechnology and Bioengineering, 2007, 97(5): 1340-1346.
- [87] Venturelli OS, Carr AC, Fisher G, et al. Deciphering microbial interactions in synthetic human gut microbiome communities [J]. Molecular Systems Biology, 2018, 14(6): e8157.
- [88] Stein RR, Tanoue T, Szabady RL, et al. Computer-guided design of optimal microbial consortia for immune system modulation [J]. Elife, 2018, 7.
- [89] Cole JA, Kohler L, Hedhli J, et al. Spatially-resolved metabolic cooperativity within dense bacterial colonies [J]. BMC Systems Biology, 2015, 9: 15.
- [90] Chan SHJ, Simons MN and Maranas CD. SteadyCom: Predicting microbial abundances while ensuring community stability [J]. PLoS Computational Biology, 2017, 13(5): e1005539.
- [91] Lamichhane S, Sen P, Dickens AM, et al. Gut metabolome meets microbiome: A methodological perspective to understand the relationship between host and microbe [J]. Methods, 2018, 149: 3-12.

- 
- [92] Motlagh AM, Bhattacharjee AS, Coutinho FH, et al. Insights of Phage-Host Interaction in Hypersaline Ecosystem through Metagenomics Analyses [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2017, 8.
  - [93] Ren J, Ahlgren NA, Lu YY, et al. VirFinder: a novel k-mer based tool for identifying viral sequences from assembled metagenomic data [J]. *Microbiome*, 2017, 5(1): 69.
  - [94] Roux S, Enault F, Hurwitz BL, et al. VirSorter: mining viral signal from microbial genomic data [J]. *PeerJ*, 2015, 3: e985.
  - [95] Edwards RA, McNair K, Faust K, et al. Computational approaches to predict bacteriophage-host relationships [J]. *FEMS Microbiology Reviews*, 2016, 40(2): 258-272.
  - [96] 李强, 衣杨, 吴忠道, 丁涛. 基于机器学习的肠道菌群数据建模与分析研究综述 [J]. *微生物学通报*, 2021, 48(1): 17.
  - [97] Riglar DT and Silver PA. Engineering bacteria for diagnostic and therapeutic applications [J]. *Nature Reviews Microbiology*, 2018, 16(4): 214-225.